bayer. Wintervogelatlas

Erste vorläufige Auswertungen

Winter 2023 / 24

Alle Meldungen 15.11.2023 – 15.02.2024

N= 304.603 Meldungen
von 2022 Personen

Raster mit mind. 10 vollst. Beobachtungslisten

Anzahl vollst. Beobachtungslisten / Raster

Anzahl vollst. Beobachtungslisten pro Quadrant

Anzahl vollst. Beobachtungslisten pro Person

Anzahl Beobachtungslisten nach Datum

Wie erwartet wurden an Wochenenden und Feiertagen die meisten Beobachtungslisten erstellt.

Dauer vollständiger Beobachtungslisten

Dauer aller Beobachtungslisten

optimale Dauer einer Beobachtungsliste (grün)

Artenzahl

Artenzahl und Beobachtungsstunden

(insgesamt wurden 234 Taxa gemeldet, Liste siehe Anhang)

Nov.2023 - Feb.2024

Beobachtungs-
-stunden

(Summe der Beob.stunden
Nov.23 – Feb.24)

Anzahl Taxa pro TK
(ssp. und Neozoen inkl.)*

○	1 - 10
○	10 - 20
○	20 - 30
○	30 - 40
○	40 - 50
○	50 - 60
○	60 - 70
○	70 - 80
○	80 - 90
○	90 - 100
○	100 - 110
○	110 - 120
○	120 - 130
○	>130

*(nur eindeutig identifizierte Taxa, also nicht z.B. „Sumpf- oder Weidenmeise“)

FAZIT 1 aus dem ersten Winter

- erfreulich viele Beobachtungen aus der Pilotphase Nov. 2023 – Feb. 2024
- wie erwartbar bleiben regional noch Lücken in Gebieten mit wenigen Ornithologinnen und Ornithologen:

=> vor allem, wenn man nur Raster mit vollständigen Beobachtungslisten betrachtet (links)

Beobachtungslisten vs. Einzelbeobachtungen

- ⇒ zählen Einzelbeobachtungen ebenso wie Beobachtungslisten?
- ⇒ Wie lange sollte eine Beobachtungsliste sein?
- ⇒ Was ist eine „vollständige“ Beobachtungsliste?

Beobachtungslisten vs. Einzelbeobachtungen

⇒ Beispiele für Auswertungsmöglichkeiten einzelner Arten
am Beispiel des Buchfinks

1. Alle Meldungen des Buchfinks 15.22.2023 – 15.02.2024
einzeln:

Beobachtungslisten vs. Einzelbeobachtungen

⇒ für einen Atlas kann aus allen Meldungen (einzeln und Beobachtungslisten eine qualitative Rasterkarte erstellt werden, die zeigt, wo Buchfinken nachgewiesen wurden:

Beobachtungslisten vs. Einzelbeobachtungen

⇒ aussagekräftiger ist es, mit den Daten aus Beobachtungslisten auch quantitative Angaben abzuleiten – und eine Abundanzkarte zu erstellen:

⇒ je röter und größer ein Punkt, desto häufiger kam der Buchfink auf Beobachtungslisten vor (prozentual, also unter Berücksichtigung unterschiedlicher Beobachtungsintensität).

Weißes Raster: keine Buchfinken auf (meist nur wenigen) Beobachtungslisten

Buchfink Abundanzen - Nordbayern

Buchfink Abundanzen - Südbayern

Wie sind die Abundanzkarten zu lesen?

- Rasterfarbe: von weiß bis dunkelgrau mit zunehmender Anzahl an vollst. Beobachtungslisten
- Punktsymbole: von klein zu groß und von hell zu dunkelrot mit zunehmender Abundanz (= prozentualer Anteil der Beobachtungslisten mit Buchfink-Nachweis)

Beispiele:

- im Quadrant 8532/1 (oberes Loisachtal westlich GAP): kein Buchfink, trotz Beobachtungsliste (allerdings nur eine Liste => weißes Raster).
- im Raster rechts daneben (8532/2, GAP) mittlere Anzahl an Listen (mittleres Grau) und eine hohe Abundanz des Buchfinks (auf 7 von 9 Listen).
- und ein Raster darüber (8432/4): viele Listen (dunkles Grau) mit nur mittlerer Abundanz des Buchfinks (Nachweis auf 50% der Listen).

FAZIT 2 aus dem ersten Winter

- Alle Beobachtungen sind nützlich und können für Arealkarten im Wintervogelatlas verwendet werden (zur Feststellung wo es Nachweise der Art gab), somit auch alle Gelegenheitsbeobachtungen.
- Beobachtungslisten sind besonders wertvoll, weil sie darüber hinaus auch quantitative Aussagen zulassen (Wo wurde eine Art häufig, wo seltener beobachtet).

FAZIT 3 aus dem ersten Winter

- Beobachtungslisten sollten möglichst immer als „vollständige“ Listen geführt werden, d.h. alle Arten wurden berücksichtigt. Das heißt nicht, dass man von allen Arten, auch den häufigsten jeweils alle Individuen einzeln verorten muss, die häufigen Arten können nach einer erstmaligen Beobachtung auf einer Liste „abgehakt“ werden (d.h. die Angabe „nicht gezählt“ nutzen).

FAZIT 4 aus dem ersten Winter

- um Beobachtungslisten optimal nutzen zu können, sollten sie eine möglichst einheitliche Länge (Dauer) haben.
 - bei nur wenigen Minuten Beobachtungszeit wird man viele Arten nicht entdecken können.
 - aber auch mehrere Stunden Beobachtungszeit ist nicht sinnvoll, da entweder ein zu großer Raum abgedeckt wird oder stationär beobachtet wird. Beides beeinträchtigt die Vergleichbarkeit für quantitative Auswertungen. Auf einer mehrstündigen Wanderung macht man besser 2 oder gar 3 Listen von jeweils ca. einer Stunde Dauer (mit etwas Zeit und Raum zwischen den einzelnen Listen).
- => Fazit: für die erste Probeauswertung wurden vor allem vollständige Listen mit mindestens 45 Minuten Dauer ausgewertet.*
- => für bessere Vergleichbarkeit der Ergebnisse sollten Beobachtungslisten immer vollständig sein und möglichst nicht kürzer als 45' und müssen auch nicht länger als 90' lang sein – für beste Vergleichbarkeit sollten Beobachtungslisten ca. eine Stunde lang dauern.
- => hat man nicht ausreichend Zeit für eine Beobachtungsliste, sind natürlich auch Gelegenheitsbeobachtungen ein wertvoller Beitrag zum Atlas (und für viele andere Verwendungen im Vogelschutz) – egal wo in Bayern sie dazu beitragen.

** Dies ist eine erste vorläufige Auswertung. Welche Listendauer letztlich für den Atlas relevant sein wird, hängt von den noch entstehenden Daten ab. Da eine längere Liste für Auswertungen ggf. gekürzt werden kann, empfehlen wir auf eine ideale Dauer von einer Stunde (mindestens aber 45 Minuten) zu achten.*

FAZIT aus dem ersten Winter

ein

-liches Dankeschön für Ihr Engagement und die beeindruckenden Ergebnisse !!!

Landesbund für Vogel- und Naturschutz
Ornithologische Gesellschaft in Bayern

Ornithologische
Gesellschaft
in Bayern e.V.

gegründet 1897

unterstützt durch die
staatliche Vogelschutzwarte
des LfU

gefördert durch den Bayerischen
Naturschutzfonds aus Mitteln des
Umweltministeriums

Bayerischer Naturschutzfonds
Stiftung des Öffentlichen Rechts

Anhang: Liste aller gemeldeten Taxa

Alpenbirkenzeisig	Feldsperling	Höckerschwan	Pfeifente	Silber- oder Mittelmeer- oder Steppenmöwe	Uhu
Alpendohle	Fichtenkreuzschnabel	Hohлтаube	Pieper, unbestimmt	Silbermöwe	Wacholderdrossel
Alpenstrandläufer	Fink, unbestimmt	Kampfläufer	Prachtaucher	Silberreiher	Wachtel
Amsel	Flussseeschwalbe	Kanadagans	Raben- oder Nebelkrähe (Aaskrähe)	Singdrossel	Waldbaumläufer
Auerhuhn	Flussuferläufer	Kanadagans-Hybrid, unbestimmt	Raben- x Nebelkrähe	Singschwan	Waldkauz
Bachstelze	Gans (Anser / Branta), unbestimmt	Kappensäger	Rabenkrähe	Sommergoldhähnchen	Waldohreule
Bahamaente	Gänsehybrid, unbestimmt	keine Art festgestellt (Nullzählung)	Raubwürger	Sperber	Waldschnepfe
Bartmeise	Gänseäger	Kernbeißer	Raufußbussard	Sperlingskauz	Waldwasserläufer
Baumläufer, unbestimmt	Gartenbaumläufer	Kiebitz	Rebhuhn	Spießente	Wanderfalke
Bekassine	Gebirgsstelze (Bergstelze)	Kleiber	Reiherente	Spornammer	Warzenente (Moschusente)
Bergente	Gimpel (Dompfaff)	Kleinspecht	Ringeltaube	Star	Wasseramsel
Bergfink	Gimpel (ssp. pyrrhula)	Kohlmeise	Rohrhammer	Steinadler	Wasserralle
Berghänfling	Girlitz	Kolbenente	Rohrdommel	Steinkauz	Weidenmeise (Mönchsmeise)
Bergpieper	Goldammer	Kolkrahe	Rohrweihe	Steppenmöwe	Weidenmeise (ssp. montanus), Alpenmeise
Blässgans	Goldhähnchen, unbestimmt	Kormoran	Rostgans	Steppenweihe	Weihe, unbestimmt
Blässhuhn	Goldregenpfeifer	Kornweihe	Rotdrossel	Sterntaucher	Weißrückenspecht
Blaumeise	Grau- x Hausgans	Krähe/Rabe, unbestimmt	Rothalsgans	Stieglitz (Distelfink)	Weißstorch
Bluthänfling (Hänfling)	Grau- x Kanadagans	Kranich	Rothalstaucher	Stock- x Kolbenente	Weißwangengans (Nonnengans)
Brandgans	Graumammer	Krickente	Rotkehlchen	Stockente	Weißwangengans-Hybrid, unbestimmt
Brautente	Graugans	Kurzschnabelgans	Rotmilan	Stockente, Bastard, fehlfarben	Wiesenpieper
Buch- oder Bergfink	Graugans-Hybrid, unbestimmt	Lachmöwe	Rotschulterente	Straßentaube (Haustaube)	Wintergoldhähnchen
Buchfink	Graureiher	Limikole, unbestimmt	Saatgans, unbestimmt	Streifengans	Würgfalke
Buntspecht	Grauspecht	Löffelente	Saatkrähe	Sturmmöwe	Zaunammer
Bussard, unbestimmt	Greifvogel, unbestimmt	Mandarinente	Säbelschnäbler	Sumpfmeise	Zaunkönig
Chileflamingo	Großer Brachvogel	Mauerläufer	Samtente	Sumpfohreule	Zilpzalp
Chilepfeifente	Großmöwe, unbestimmt	Mäusebussard	Schellente	Tafel- x Moorente	Zippammer
Dohle	Grünfink	Meise, unbestimmt	Schleiereule	Tafel- x Reiherente	Zwergkanada- x Weißwangengans
Dreizehenspecht	Grünschenkel	Merlin	Schnatterente	Tafelente	Zwergkanadagans
Drossel, unbestimmt	Grünspecht	Misteldrossel	Schneeammer	Taiga- / Alpenbirkenzeisig (Birkenzeisig)	Zwergmöwe
Eichelhäher	Habicht	Mittelmeer- oder Steppenmöwe	Schwanzmeise	Taigabirkenzeisig	Zwergsäger
Eiderente	Haubenmeise	Mittelmeermöwe	Schwanzmeise (ssp. caudatus)	Tannenhäher	Zwergscharbe
Eistaucher	Haubentaucher	Mittelsäger	Schwarzhalstaucher	Tannenmeise	Zwergschnepfe
Eisvogel	Haus- x Gartenrotschwanz	Mittelspecht	Schwarzkehlchen	Tauchenten-Hybrid, unbestimmt	Zwergschwan
Elster	Hausente	Mönchsgrasmücke	Schwarzmilan	Teichhuhn	Zwergtaucher
Ente, unbestimmt	Hausgans	Moorente	Schwarzschwan (Trauerschwan)	Teichrohrsänger	
Enten-Hybrid, unbestimmt	Hausrotschwanz	Möwe, unbestimmt	Schwarzspecht	Thorshühnchen	
Erlenzeisig	Haussperling	Nebelkrähe	Schwarzstorch	Trauerente	
Falke, unbestimmt	Heckenbraunelle	Nilgans	Seeadler	Tundrasaatgans	
Fasan (Jagdfasan)	Heidelerche	Ohren- oder Schwarzhalstaucher	Seidenschwanz	Türkentaube	
Feldlerche	Heringsmöwe	Ohrentaucher		Turmfalke	

N=234 (inkl. ssp, Neozoen, Hybride und nicht eindeutige bestimmte Taxa)